



Síntomas:
 Tos, Disnea
 Fiebre, Mialgia
 Dolor de pecho
 Dolor de cabeza, Expectoraciones
 Empeoramiento de la condición en general (perdida de apetito, fatiga generalizada)
 Síntomas del oído, nariz, garganta (odinodisfagia, rinorrea, anosmia, pérdida del gusto)
 Síntomas gastrointestinales (náuseas, diarrea)

Signos de gravedad:
 Disnea: Dificultad respiratoria audible (incapaz de hacer frases completas, sibilancias audibles, frases rotas, testigo describiendo la situación)
 Empeoramiento del estado general (incapaz de ponerse de pie)
 Nivel de conciencia alterado (confusión)
 Signos vitales y parámetros, si están disponibles: Pulso <40,> 130bpm, Presión sanguínea sistólica <90 o> 180mmHg, SaO2 <93%, GCS <15)

Signos clínicos de alerta:
 Disnea: Dificultad para respirar, que interfiere con las actividades de la vida diaria (comer, subir escaleras, ducharse)
 Fiebre >5 días o que empeora y no responde a la medicación
 Empeoramiento de la tos, Hemoptisis
 Dolor en el pecho de moderado a severo
 Confusión, Empeoramiento del estado general (perdida de apetito, fatiga generalizada)
 Empeoramiento de los síntomas gastrointestinales con incapacidad para hidratarse

Criterios de fragilidad:
 Alto nivel de ansiedad
 Aislamiento
 Ambiente psicosocial inestable
 Dificultad para sobrellevar las actividades diarias (ir de compras, cuidar a los seres queridos y otras necesidades)

